

Ocena poziomu infestacji ptaszyńcem kurzym



poziom 0

Stan otoczenia

- Brak widocznych pasożytów na elementach strukturalnych hodowli (klatki, karmniki itd.)

Stan ptaków

- Ptaki w bardzo dobrej kondycji/ bardzo dobry stan ptaków,
- Zadowolająca produkcja jaj,
- Spożycie paszy oraz masa ptaków w normie,
- Kompletne, pełne, zdrowe upierzenie,
- Prawidłowy kolor grzebienia,
- Brak pasożytów

Działanie

OPRYSK
PREWENCYJNY

poziom 1

- widoczne pojedyncze osobniki pasożytów na elementach strukturalnych hodowli

- Spożycie paszy oraz produkcja jaj w normie,
- Prawidłowa masa ciała ptaków,
- Kompletne upierzenie,
- Prawidłowy kolor grzebienia,
- Pojedyncze pasożyty bytujące na ciele ptaków

ZABIEG
PREWENCYJNY
(DWA OPRYSKI)

poziom 2

- Niewielkie skupiska pasożytów widoczne na elementach strukturalnych hodowli

- Spadek produkcji jaj,
- Wzrost spożycia paszy,
- Niewielki spadek masy ciała ptaków,
- Pobudzenie ptaków,
- Widoczna częściowa utrata upierzenia,
- Widoczne pasożyty na ciele ptaków

WYMAGANY ZABIEG
INTERWENCYJNY

poziom 3

- widoczne liczne skupiska pasożytów na elementach strukturalnych hodowli
- widoczne liczne skupiska pasożytów w okolicy gniazda

- Znaczny spadek produkcji jaj,
- Znaczny wzrost spożycia paszy,
- Znaczny spadek masy ciała ptaków,
- Utrata fragmentów upierzenia (widoczna skóra), błady grzebień,
- Osłabienie - ptaki zaczynają padać,
- Liczne pasożyty widoczne na ciele ptaków.

WYMAGANY
NATYCHMIASTOWY
ZABIEG



202105-1-0-0


Ile potrzeba preparatu by przeprowadzić zabieg?

Chów klatkowy

Jeden zabieg składa się z dwóch oprysków (z zachowaniem 7 – dniowego odstępu pomiędzy opryskami)) roztworem o stężeniu 0.6%, stosując 100 ml roztworu roboczego na m² powierzchni.

Oblicz całkowitą powierzchnię oprysku: ściany, podłogi, system klatek

Aby prawidłowo oszacować zużycie preparatu odwiedź: dergall.com/calculator



Przykład:

Hodowla: Dł: 60 m, Szer: 8m, Wys: 7m.
6 rzędów klatek:
2 rzędy po 4 piętra;
2 rzędy po 5 pięter;
2 rzędy po 6 pięter.
1 rząd = 30 klatek.
Ilość ptaków: 40 000.

Wymagana ilość produktu:
10 L Dergall dodane do 1660 L wody = >0.6% roztwór

Stosować profilaktycznie raz w miesiącu.
Zabieg przeprowadzać każdorazowo w przypadku wzrostu populacji ptaszyńca.

Każda hodowla ma swoją charakterystykę.
Zaleca się zatem konsultację z lekarzem weterynarii bądź lokalnym dystrybutorem, w celu opracowania programu profilaktyki i kontroli inwazji ptaszyńca, który będzie indywidualnie dostosowany do potrzeb określonej fermy. Zabieg do danej hodowli.

Czym najlepiej nanosić Dergall®?

Aby uzyskać optymalne rezultaty zabiegu, w zależności od wielkości kurnika, należy wybrać odpowiedni sprzęt do wykonania oprysku:

Opryskiwacze ogrodowe, ręczne lub elektryczne:

- dysza płasko strumieniowa o wydatku cieczy 0.8-1,2 L/ na minutę,
- ciśnienie pracy 0.3 - 0.5 MPa,
- niski poziom hałasu pracy zestawu.



Polecany do małych kurników lub do oprysku miejsc trudno dostępnych w większych obiektach.

Specjalistyczny opryskiwacz pneumatyczny:

- jednostronny/dwustronny, obrotowy regulowany maszt 2,1m - 6,5 m,
- wydatek cieczy na jedną dyszę 0,8 - 1,2 l/min.,
- możliwość dowolnej konfiguracji dysz,
- zbiornik z pompą elektryczną,
- niski poziom hałasu pracy zestawu.



Skuteczność i bezpieczeństwo

w zwalczaniu ptaszyńca kurzego w hodowli drobiu